

# 隔離註記

- 實驗室檢驗報告為須隔離狀態，系統自動帶出隔離註記。
- 若系統無註記，但病人符合須隔離條件者，請預先執行防護措施於上班日(8:00~17:00)電聯單位所屬感管師進行系統註記。
- 隔離註記說明如下：

※防跌高	A8-152	李	89	1 10711
※防跌高	A8-162	黃	51	9 10712
※防跌高	A8-171	彭	1089	3 10712
防跌圍高	A8-172	鄭	3071	9 10712
※防跌	A8-181	何	1444	7 10712
	A8-191	方	3476	5 10712
防跌高	A8-192	施	1831	5 10711
	A8-201	田	14	3 10712
高	A8-202	陳	76	2 10712
高	A8-223	詹	3098	9 10712
防跌高	A8-23A	張	3420	2 10712
防跌高	A8-25A	楊	72	7 10712
※警	A8-302	陳	2864	1 10712
	A8-03B	張	288	4 1041
※高	A8-072	張	309	7 1041
圍	A8-08B	張	1	6 1041

顏色

紅色—空氣隔離  
黃色—接觸隔離  
橘色—空氣+接觸隔離  
藍色—濕洗手  
粉紫色—血液傳染疾病

照...	註記
	收案,接觸,A+,灌
	盤,高風險
	未核,接觸,血液,精血,B+,盤,電,高風險
	未核,電
	電,高風險
	電,高風險
	收案,接觸(濕洗手),O+,電,復健,高風險

文字

# 解除隔離條件

多重抗藥菌

- 抗生素治療結束後，原部位**1-2週**內培養三套呈陰性

VRE

- 每隔**一星期**做**一次**「糞便培養 for VRE」連續**三次**培養為陰性

MRSA

- 若無法從原部位作培養(如:症狀改善、傷口癒合)三套呈陰性，  
則作「**鼻腔拭子 for MRSA**」一套陰性

*Clostridium  
difficile*

- 無**腹瀉**症狀

疥瘡

- 完成疥瘡藥物治療療程後，建議由**皮膚科**或**感染科**醫師臨床  
診斷已不具傳染性